

## ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ на выполнение процедуры препаратом Ботулакс (Ботулинический токсин типа А – гемагглютинин комплекс)

Я, \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

Дата рождения \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

даю свое согласие на проведение процедуры введения препарата БОТУЛАКС врачом

Телефон врача \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

Я подтверждаю, что меня проинформировали о ходе процедуры и применяемом препарате БОТУЛАКС.

Препарат БОТУЛАКС предназначен для коррекции мимических морщин и вводится внутримышечно.

Я согласен(а) на проведение процедуры препаратом БОТУЛАКС.

Я уведомлен, что процедура проводится квалифицированным специалистом, прошедшим специальное обучение и подготовку

(фамилия, имя, отчество)

### Я ОЗНАКОМЛЕН(А) СО СПИСОМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕПАРАТОМ БОТУЛАКС.

#### Общие противопоказания:

- Доказанная гиперчувствительность к любому компоненту препарата
- Воспалительный процесс в месте предполагаемых инъекций
- Острая фаза воспалительных заболеваний
- Беременность и лактация
- Возраст до 18 и старше 65 лет
- Миастения gravis или синдром Лиаберта-Итона

#### Препарат БОТУЛАКС необходимо с осторожностью использовать при:

- Гравитационном птозе
- Склонностью к отекам
- Грыжах верхних и нижних век

#### Я ознакомлен(а) с побочными проявлениями процедуры препаратом Ботулакс.

- Местные реакции: птоз, отеки, экхимозы, боли и раздражение в месте инъекции, которые проходят самостоятельно в течение нескольких дней
- Реакции со стороны нервной системы: парестезии, головные боли
- Реакции со стороны опорно-двигательного аппарата: мышечная слабость
- Реакция со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота

Частота побочных реакций составляет 1–10 %. Я предупрежден(а), что если какое-либо из нежелательных явлений становится более выраженным или проявляется побочный эффект, не перечисленный в списке, то следует немедленно обратиться к своему лечащему врачу.

Я предупрежден(а), что при одновременном применении Ботулакс и антибиотиков, курареподобных препаратов происходит потенцирование, а при одновременном применении тетрациклинов ослабление или отсутствие эффекта.

При проведении процедуры с применением препарата БОТУЛАКС клинический эффект длится 3,5–4 месяца и более.


Мне были даны послеоперационные рекомендации и объяснено, что в случае нарушения режима могут проявляться побочные эффекты или привести к ослаблению или отсутствию клинического результата.

#### Рекомендации до и после процедуры:

- Не принимать горизонтальное положение в течение 4 часов после процедуры
- Не массировать и не прогревать область инъекции
- Совершать активные мимические движения в течение 20–30 минут
- Ограничить посещение сауны, бани накануне процедуры и в течение 2–3 дней после
- В день процедуры рекомендуется не употреблять алкоголь

Мне разъяснено: в доступной для меня форме цели, методы вмешательства, связанный с ними риск, возможные альтернативные варианты процедур, их последствия, в том числе вероятность развития осложнений, а также предполагаемые результаты оказания медицинской помощи. Я согласен(на) на фотосъемку и видеосъемку до и после процедуры препаратом БОТУЛАКС и использование материалов фото и видеосъемки врачом или медицинским учреждением, в котором проводится процедура препаратом БОТУЛАКС на безвозмездной основе в научных целях. Подтверждаю, что вся информация по моему состоянию здоровья предоставлена мной в максимально в полном объеме.

Номер серии БОТУЛАКС \_\_\_\_\_ Дата изготовления \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



### ПРОТОКОЛ КОРРЕКЦИИ БОТУЛАКС

Общая доза BOTULAX® ЕД:

Ф.И.О. пациента \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Ф.И.О. врача \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата проведения процедуры: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года.